




QUANDO É A HORA DE DESMAMAR?

A resposta é por volta do 21º dia de nascimento.



Camundongos e ratos

Nesse momento, os filhotes de camundongos e ratos já estão prontos para a autonomia: eles já consomem água e ração sozinhos. É a sua chance de iniciar o processo de desmame e, ao mesmo tempo, de fazer a sexagem.



Como diferenciar machos e fêmeas?

Observe bem a região entre o ânus e os genitais do filhote.

- Machos: A distância é maior.
- Fêmeas: A distância é menor.

Passo a passo para o desmame:

1

Prepare a casa nova:

Antes de começar, tenha os microisoladores (ou gaiolas) limpos e prontos para receber os filhotes, com água e ração.

2

Manuseio seguro:

Use EPIs e retire os filhotes com cuidado da caixa da matriz.

3

Separe por sexo:

Identifique o sexo de cada um e coloque machos e fêmeas em caixas separadas. Isso evita acasalamentos indesejados e garante o controle populacional da colônia.

4

Não esqueça de anotar:

Anote a data de nascimento dos filhotes e a data do desmame na ficha de identificação da caixa. Isso é fundamental para o controle do biotério.

LEMBRE-SE

Um manejo correto durante o desmame e a sexagem é fundamental para a saúde da sua colônia e para a qualidade dos resultados de suas pesquisas.



CAMBE UFRJ



cambe@ccsdecania.ufrj.br



www.cambeufrj.com



@cambe.ufrj